

令和4年度 南部町予防接種日程表

予防接種を受ける際は、母子健康手帳と町から配布されている予診票を必ずご持参ください。

お忘れになりますと、接種できませんのでお気を付けください！

予防接種名	対象年齢 (無料で受けられる期間)		標準接種年齢 (接種に適した年齢)	接種間隔 および 接種回数	
ロタウイルス <small>※R2.8月生まれから対象</small>	1価 <small>(D197)</small>	出生6週0日後から 24週0日後まで	初回接種(1回目)は 出生14週6日後までに 接種してください ※原則として同一ワクチンを接種	27日以上の間隔をおいて 2回接種 (経口投与・・飲むワクチン)	
	5価 <small>(D197)</small>	出生6週0日後から 32週0日後まで		27日以上の間隔をおいて 3回接種 (経口投与・・飲むワクチン)	
B型肝炎	1歳未満		生後2～9か月未満	1回目から27日以上の間隔をおいて 2回目 1回目から139日以上の間隔をおいて 3回目	
BCG (結核)	1歳未満		生後5～8か月未満	1回接種	
四種混合 <small>(ジフテリア・百日せき 破傷風・ポリオ)</small>	生後3～90か月(7歳6か月)未満		初回 接種	生後3～12か月 20日以上、標準的には56日までの間隔を おいて 3回接種	
			追加 接種	初回接種(3回)終了後 から12～18か月の間 初回接種(3回)終了後6か月以上、標準的 には12～18か月の間隔をおいて 1回接種	
二種混合 <small>(ジフテリア・破傷風)</small>	11歳以上13歳未満 <small>※三種混合又は四種混合を、3～4回接種 している方が対象です。</small>		小学6年生(11歳～12歳)	1回接種	
麻しん・風しん (MR混合)	第1期	生後12～24か月未満	第1期	生後12～24か月未満 1回接種	
	第2期	小学校入学前の1年間 (年長児)	第2期	小学校入学前の1年間 (年長児) 1回接種	
水痘 (水ぼうそう)	生後12～36か月(3歳)未満		1回目	生後12～15か月未満 1回接種	
			2回目	1回目接種終了後から 6～12か月の間 1回目接種終了後 3か月以上、標準的には 6～12か月の間隔をおいて 1回接種	
日本脳炎	第1期	生後6～90か月 (7歳6か月)未満	第1期 初回	3歳に達したときから 4歳に達するまで 6日以上、標準的には28日までの間隔を おいて 2回接種	
			第1期 追加	4歳に達したときから 5歳に達するまで 初回接種(2回)終了後6か月以上、標準的 にはおおむね1年の間隔をおいて 1回接種	
	第2期	9歳以上13歳未満	第2期	小学4年生(9歳～10歳) 1回接種	
ヒトパピローマ ウイルス感染症 (子宮頸がん予防)	小学校6年生～高校1年生に 相当する年齢の女子 ※原則として同一ワクチンを接種		中学1年生に相当する年齢	2価 <small>(サーバリックス)</small>	1回目から1か月の間隔をおいて 2回目 1回目から6か月の間隔をおいて 3回目
				4価 <small>(ガーダシル)</small>	1回目から2か月の間隔をおいて 2回目 1回目から6か月の間隔をおいて 3回目

※ **同じ種類のワクチンを複数回接種する場合には、それぞれ定められた間隔(表の「接種間隔および接種回数」参照)がありますので、間違わないようにしましょう。**

【お問合せ先】 南部町健康こども課(南部町健康センター内) ☎ 0178-60-7100




予防接種名	対象年齢 (無料で受けられる期間)	標準接種年齢 (接種に適した年齢)		接種間隔 および 接種回数
		初回 接種	追加 接種	
ヒブ Hib	生後2～60か月(5歳)未満	初回 接種	生後2～7か月未満	27日以上、標準的には56日までの間隔 をおいて 3回接種
		追加 接種	初回接種(3回)終了後 から7～13か月の間	初回接種(3回)終了後7か月以上、標準的 には13か月までの間隔をおいて 1回接種 <small>※ただし、生後12か月までに初回接種が終了していない 場合は、初回接種の残りの回数を行わずに初回接種の最 後の接種後27日以上の間隔をおいて1回接種。</small>
小児用肺炎球菌	生後2～60か月(5歳)未満	初回 接種	生後2～7か月未満	標準的には生後12か月までに27日以上の 間隔をおいて 3回接種 <small>※ただし、初回2回目・3回目は生後24か月までに行い、 生後24か月を超えた場合は初回接種は行わない。 また、初回2回目の接種が生後12か月を超えた場合は、初 回3回目の接種は行わない。</small>
		追加 接種	生後12～15か月の間	初回接種(3回)終了後60日以上の間隔を おいて、生後12か月以降に 1回接種

◆ ヒブと小児用肺炎球菌は、**接種開始時期により接種回数が変わります**ので、下記をご確認ください ◆

予防接種名	接種開始時期	接種間隔 および 接種回数	
ヒブ Hib <small>※対象年齢は通常と同じ</small>	生後7～12か月未満	初回 接種	27日以上、標準的には56日までの間隔をおいて 2回接種
		追加 接種	初回接種終了後7か月以上、標準的には13か月までの間隔をおい て 1回接種 <small>※ただし、生後12か月までに初回接種が終了していない場合は、初回接種の残り回数を行 わずに、初回接種の最後の接種後27日以上の間隔をおいて1回接種。</small>
	生後12～60か月(5歳)未満	1回接種	
小児用肺炎球菌 <small>※対象年齢は通常と同じ</small>	生後7～12か月未満	初回 接種	標準的には生後12か月までに、27日以上の間隔をおいて2回接種 <small>※ただし、初回2回目は生後24か月までに行い、生後24か月を超えた場合は行わない。</small>
		追加 接種	初回接種終了後60日以上の間隔をおいて、生後12か月以降に1回 接種
	生後12～24か月(2歳)未満 生後24～60か月(5歳)未満	60日以上の間隔をおいて 2回接種 1回接種	

予防接種の接種間隔について

異なる種類のワクチンを接種する際の接種間隔は、令和2年10月から下表のとおり変更になりました。



★注意 接種から数日間は、発熱や接種部位が腫れるなどの症状がでることがあります。ルール上接種が可能
な期間であっても、お子さんの体調に問題がないことを確認してから接種をうけましょう！

- * 注射生ワクチン . . . BCG、麻しん・風しん(MR混合)、水痘 など
- * 経口生ワクチン . . . ロタウイルス など
- * 不活化ワクチン . . . Hib、小児用肺炎球菌、B型肝炎、四種混合、二種混合、日本脳炎
ヒトパピローマウイルス など

裏面もご覧ください ⇒