

2019年度 南部町予防接種日程表

予防接種名	対象年齢 (無料で受けられる期間)	標準接種年齢 (接種に適した年齢)	接種間隔 および 接種回数
B型肝炎	1歳未満	生後2～9か月未満	1回目から27日以上の間隔を置いて、2回目 1回目から139日以上の間隔を置いて3回目
BCG (結核)	生後3～12か月未満	生後5～8か月未満	1回接種
四種混合 (ジフテリア・百日咳・ 破傷風・ポリオ)	生後3～90か月未満 (7歳6か月)	初回接種 生後3～12か月 追加接種 初回接種(3回)終了後 から12～18か月の間	20日以上、標準的には56日までの間隔を おいて3回接種 初回接種(3回)終了後6か月以上、標準的 には12～18か月の間隔を置いて1回接種
二種混合 (ジフテリア・破傷風)	小学校6年生の期間	小学校6年生の期間	1回接種
MR混合 (麻しん・風しん混合)	第1期 生後12～24か月未満	第1期 生後12～24か月未満	1回接種
	第2期 小学校入学前の1年間	第2期 小学校入学前の1年間	1回接種
水痘 (水ぼうそう)	生後12か月～36か月未満 (3歳)	初回接種 生後12～15か月未満 追加接種 初回接種終了後から 6～12か月の間	1回接種 初回接種終了後3か月以上、標準的には 6～12か月の間隔を置いて1回接種
日本脳炎	第1期 生後6～90か月未満 (7歳6か月)	第1期 初回 3歳に達したときから 4歳に達するまで 追加 4歳に達したときから 5歳に達するまで	6日以上、標準的には28日までの間隔を おいて2回接種 初回接種(2回)終了後6か月以上、標準的 にはおおむね1年の間隔を置いて1回接種
	第2期 9歳～13歳未満	第2期 小学校4年生の期間	1回接種

異なった種類のワクチンを接種する場合の間隔

予防接種で使うワクチンには、**生ワクチン**(生きた細菌やウイルスの毒性を弱めたもの)と、**不活化ワクチン**(細菌やウイルスを殺し抵抗力(免疫)をつくるのに必要な成分を取り出して毒性をなくしたもの)があり、異なった種類のワクチンを接種する場合には、右記の間隔を守ることが必要です。

なお、同じ種類のワクチンを複数回接種する場合には、それぞれ定められた間隔(上の表の「接種間隔」参照)がありますので、間違えないようにしてください。

異なった種類のワクチンを同時に接種する場合は、医師とよく相談してください。

対象年齢を過ぎた場合の接種について

対象年齢内での接種(定期接種)であれば接種料金は無料で受けられますが、**対象年齢を過ぎてしましますと任意接種となり、全額自己負担での接種となります**ので、ご注意ください。

また、対象年齢以外での予防接種を実施していない医療機関もありますので、あらかじめ医療機関へお問合せください。




予防接種名	対象年齢 (無料で受けられる期間)	標準接種年齢 (接種に適した年齢)		接種間隔 および 接種回数
		初回接種	追加接種	
ヒブ Hib	生後2～60か月未満 (5歳)	初回接種	生後2～7か月未満	27日以上、標準的には56日までの間隔 を置いて3回接種
		追加接種	初回接種(3回)終了後 から7～13か月の間	初回接種(3回)終了後7か月以上、標準的 には13か月までの間隔を置いて1回接種 ※ただし、生後12か月までに初回接種が終了していない 場合は、初回接種の残りの回数を行わずに初回接種の最 後の接種後27日以上の間隔を置いて1回接種。
小児用肺炎球菌	生後2～60か月未満 (5歳)	初回接種	生後2～7か月未満	標準的には生後12か月までに27日以上 の間隔を置いて3回接種 ※ただし、初回2回目・3回目は生後24か月までに行い、 生後24か月を超えた場合は初回接種は行わない。 また、初回2回目の接種が生後12か月を超えた場合は、初 回3回目の接種は行わない。
		追加接種	生後12～15か月の間	初回接種(3回)終了後60日以上の間隔を おいて、生後12か月以降に1回接種


◆ ヒブと小児用肺炎球菌は、**接種開始時期により接種回数が変わります**ので、下記をご確認ください ◆

予防接種名	接種開始時期	接種間隔 および 接種回数
ヒブ Hib ※対象年齢は通常と同じ	生後7～12か月未満	初回接種 27日以上、標準的には56日までの間隔を置いて2回接種 追加接種 初回接種終了後7か月以上、標準的には13か月までの間隔を おいて1回接種 ※ただし、生後12か月までに初回接種が終了していない場合は、初回接種の残り回数を行 わずに、初回接種の最後の接種後27日以上の間隔を置いて1回接種。
	生後12～60か月(5歳)未満	1回接種
小児用肺炎球菌 ※対象年齢は通常と同じ	生後7～12か月未満	初回接種 標準的には生後12か月までに、27日以上の間隔を置いて2回接種 追加接種 初回接種終了後60日以上の間隔を置いて、生後12か月以降に1回 接種
	生後12～24か月(2歳)未満	60日以上の間隔を置いて2回接種
	生後24～60か月(5歳)未満	1回接種

◆ **生ワクチンを接種した日の翌日から、別の予防接種を行う日までの間隔を、27日以上おく**



◆ **不活化ワクチンを接種した日の翌日から、別の予防接種を行う日までの間隔を、6日以上おく**



裏面もご覧ください ⇒