

令和3年度 南部町予防接種日程表

予防接種を受ける際は、母子健康手帳と町から配布されている予診票を必ずご持参ください。

お忘れになりますと、接種できませんのでお気を付けください！

予防接種名	対象年齢 (無料で受けられる期間)		標準接種年齢 (接種に適した年齢)	接種間隔 および 接種回数	
	1価 (0ワクチン)	出生6週0日後から 24週0日後まで		初回接種(1回目)は 出生14週6日後までに 接種してください	27日以上の間隔において 2回接種 (経口投与・・飲むワクチン)
ロタウイルス <small>※R2.8月生まれから 対象</small>	5価 (0ワクチン)	出生6週0日後から 32週0日後まで	※原則として同一ワクチンを接種	27日以上の間隔において 3回接種 (経口投与・・飲むワクチン)	
B型肝炎	1歳未満		生後2～9か月未満	1回目から27日以上の間隔において 2回目 1回目から139日以上の間隔において 3回目	
BCG (結核)	1歳未満		生後5～8か月未満	1回接種	
四種混合 (ジフテリア・百日咳・ 破傷風・ポリオ)	生後3～90か月(7歳6か月)未満		初回 接種	生後3～12か月	20日以上、標準的には56日までの間隔を おいて 3回接種
			追加 接種	初回接種(3回)終了後 から12～18か月の間	初回接種(3回)終了後6か月以上、標準的 には12～18か月の間隔を おいて 1回接種
二種混合 (ジフテリア・破傷風)	11歳以上13歳未満 <small>※三種混合又は四種混合を、3～4回接種 している方が対象です。</small>		小学6年生(11歳～12歳)		1回接種
MR混合 (麻しん・風しん混合)	第1期	生後12～24か月未満	第1期	生後12～24か月未満	1回接種
	第2期	小学校入学前の1年間 (年長児)	第2期	小学校入学前の1年間 (年長児)	1回接種
水痘 (水ぼうそう)	生後12か月～36か月(3歳)未満		1回目	生後12～15か月未満	1回接種
			2回目	1回目接種終了後から 6～12か月の間	1回目接種終了後 3か月以上、標準的には 6～12か月の間隔を おいて 1回接種
日本脳炎	第1期	生後6～90か月 (7歳6か月)未満	第1期 初回	3歳に達したときから 4歳に達するまで	6日以上、標準的には28日までの間隔を おいて 2回接種
			第1期 追加	4歳に達したときから 5歳に達するまで	初回接種(2回)終了後6か月以上、標準的 にはおおむね1年の間隔を おいて 1回接種
	第2期	9歳以上13歳未満	第2期	小学4年生(9歳～10歳)	1回接種
ヒトパピローマ ウイルス感染症 (子宮頸がん予防)	小学6年生～高校1年生に相当 する年齢の女子		中学1年生に相当する年齢		2価 (サーバリックス) 同一のワクチンを 3回接種 4価 (ガーガシル) (ワクチンの種類によって 接種間隔が異なります)
	厚生労働省からの通知により、積極的な接種勧奨を見合わせておりますが、希望者には予診票をお渡ししています。				

※ 同じ種類のワクチンを複数回接種する場合には、それぞれ定められた間隔(表の「接種間隔および接種回数」参照)がありますので、間違わないようにしましょう。

【お問合せ先】 南部町健康子ども課(南部町健康センター内) ☎ 0178-60-7100




予防接種名	対象年齢 (無料で受けられる期間)	標準接種年齢 (接種に適した年齢)	接種間隔 および 接種回数
ヒブ Hib	生後2～60か月(5歳)未満	初回 接種	生後2～7か月未満 27日以上、標準的には56日までの間隔 を おいて 3回接種
		追加 接種	初回接種(3回)終了後 から7～13か月の間 初回接種(3回)終了後7か月以上、標準的 には13か月までの間隔を おいて 1回接種 <small>※ただし、生後12か月までに初回接種が終了していない 場合は、初回接種の残りの回数を行わずに初回接種の最 後の接種後27日以上の間隔を おいて1回接種。</small>
小児用肺炎球菌	生後2～60か月(5歳)未満	初回 接種	生後2～7か月未満 標準的には生後12か月までに27日以上の 間隔を おいて 3回接種 <small>※ただし、初回2回目・3回目は生後24か月までに行い、 生後24か月を超えた場合は初回接種は行わない。 また、初回2回目の接種が生後12か月を超えた場合は、初 回3回目の接種は行わない。</small>
		追加 接種	生後12～15か月の間 初回接種(3回)終了後60日以上の間隔を おいて、生後12か月以降に 1回接種

◆ ヒブと小児用肺炎球菌は、接種開始時期により接種回数が変わりますので、下記をご確認ください ◆

予防接種名	接種開始時期	接種間隔 および 接種回数
ヒブ Hib <small>※対象年齢は通常と同じ</small>	生後7～12か月未満	初回 接種 27日以上、標準的には56日までの間隔を おいて 2回接種 追加 接種 初回接種終了後7か月以上、標準的には13か月までの間隔を おいて 1回接種 <small>※ただし、生後12か月までに初回接種が終了していない場合は、初回接種の残り回数を行 わずに、初回接種の最後の接種後27日以上の間隔を おいて1回接種。</small>
	生後12～60か月(5歳)未満	1回接種
小児用肺炎球菌 <small>※対象年齢は通常と同じ</small>	生後7～12か月未満	初回 接種 標準的には生後12か月までに、27日以上の間隔を おいて2回接種 <small>※ただし、初回2回目は生後24か月までに行い、生後24か月を超えた場合は行わない。</small> 追加 接種 初回接種終了後60日以上の間隔を おいて、生後12か月以降に1回 接種
	生後12～24か月(2歳)未満	60日以上の間隔を おいて 2回接種
	生後24～60か月(5歳)未満	1回接種

予防接種の接種間隔の変更について(お知らせ)

異なる種類のワクチンを接種する際の接種間隔が、下表のとおり変更になりました。



★注意 接種から数日間は、発熱や接種部位が腫れるなどの症状がでることがあります。ルール上接種が可能
な期間であっても、お子さんの体調に問題がないことを確認してから接種をうけましょう！

- * 注射生ワクチン . . . BCG・MR混合(麻しん風しん混合)・水痘 など
- * 経口生ワクチン . . . ロタウイルス など
- * 不活化ワクチン . . . Hib・小児用肺炎球菌・B型肝炎・四種混合・二種混合・日本脳炎
ヒトパピローマウイルス など

裏面もご覧ください ⇒